

TEA

(Trastorno del Espectro Autista)

y

su Tx. Médico Homeopático

Dr. Alejandro Ortiz Gutiérrez
Medico Homeópata Cirujano y Partero



INTRODUCCIÓN

- Enfermedad
- Síndrome
- Padecimiento
- Trastorno



- Autismo ó Síndrome de Asperger
- Trastorno del Espectro Autista (TEA – DSM v)
- Trastorno Generalizado del Desarrollo. (TGD –CIE10)



DEFINICIÓN

- El autismo (auto- αὐτός e -ismos)
- Trastorno del neurodesarrollo
 - Social, Comunicación, Comportamiento

AUTISMO

- Un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por alteración de la interacción social, la comunicación verbal y no verbal y el comportamiento restringido y repetitivo.





- Por primera vez en 1912 por el psiquiatra suizo Eugene Bleuler, en un artículo publicado en el American Journal of Insanity.



Eugen Bleuler

Psiquiatra

Paul Eugen Bleuler fue un psiquiatra suizo, más conocido por haber acuñado el término esquizofrenia, y por sus contribuciones al campo de las enfermedades mentales. Bleuler nació en Zollikon, un pequeño poblado cercano a Zúrich, Suiza. [Wikipedia](#)

Fecha de nacimiento: 30 de abril de 1857, Zollikon, Suiza

Fecha de la muerte: 15 de julio de 1939, Zollikon, Suiza

Educación: Universidad de Zúrich

Asesor Académico / Asesora Académica: Jean-Martin Charcot

Alumno Destacado / Alumna Destacada: Carl Gustav Jung

- La clasificación médica del autismo: ocurrió hasta 1943, cuando el Dr. Leo Kanner, del Hospital Johns Hopkins.
 - estudió a un grupo de once niños e introdujo la caracterización autismo infantil temprano.

Leo Kanner

Psiquiatra

Leo Kanner fue un psiquiatra austríaco de origen judío conocido por su descripción del síndrome conocido como autismo. Nació en Klekotiv, en Galizia, en el Imperio Austrohúngaro, en 1894.
[Wikipedia](#)



Fecha de nacimiento: 13 de junio de 1894, Austria

Fecha de la muerte: 3 de abril de 1981, Sykesville, Maryland, Estados Unidos

Educación: Universidad Humboldt de Berlín

- El Dr. Hans Asperger, utilizó coincidentemente el término psicopatía autista en niños que exhibían características similares. Sin embargo, no fue reconocido hasta 1981 (por medio de Lorna Wing).



Hans Asperger

Hans Asperger fue pediatra, investigador, psiquiatra y profesor de medicina austriaco. Es conocido por su tempranos estudios sobre desórdenes mentales, especialmente en niños. [Wikipedia](#)


Fecha de nacimiento: 18 de febrero de 1906, Hausbrunn, Austria

Fecha de la muerte: 21 de octubre de 1980, Viena, Austria

Educación: [Universidad de Viena](#)


- DSM-I y en el DSM-II (1952 y 1968) el Autismo era considerado un síntoma de Esquizofrenia.
- DSM-III (1980) se comenzó a hablar de Autismo Infantil.
- DSM-III- R (1987) de incluyó el Trastorno Autista.
- DSM-IV-TR (2000) se definen cinco categorías diagnosticas dentro de los Trastornos Generalizados del Desarrollo (TGD): Trastorno Autista, Trastorno de Rett, Trastorno Desintegrativo Infantil, Trastorno de Asperger y Trastorno Generalizado del Desarrollo no especificado.
- DSM-5 (2013) única categoría, el Trastorno del Espectro Autista (TEA) o (ASD) Autism Spectrum Disorder.

ETIOLOGIA




BASES NEUROBIOLÓGICAS:

- Se sugiere que en la mayoría de los casos el autismo es un desorden heredable tanto como la personalidad o el cociente intelectual.
- Hay genes relacionados con la Epilepsia, el $SNC1A$ (Causante del Síndrome de Dravet) y el $PCDH19$ (provoca el síndrome llamado Juberg Hellman).



ESTRUCTURALES

- El cerebro es más grande y pesado
- Diferencias en algunas regiones del cerebro, incluyendo el cerebelo, la amígdala, el hipocampo, el septo y los cuerpos mamilares.
- Producción de serotonina y otros neurotransmisores en el cerebro.




FACTORES AMBIENTALES

- Propuesto varios factores ambientales que podrían **afectar el desarrollo** de una persona genéticamente predispuesta al autismo:
 - Vacunas
 - Factores Obstétricos
 - Crianza – Conductuales. apego, cariño y atención




CONEXIÓN INTESTINO - CEREBRO

- Sensibilidad al gluten no celíaca y trastornos neuropsiquiátricos





Autismo a partir de Manuales.



CIE ó ICD - 10

- La CIE-10 es el acrónimo de la Clasificación Internacional de Enfermedades.
- ICD, siglas de International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems
 - F84 Trastornos Generalizados del Desarrollo




Tabla de contenidos

- **F84.0 Autismo infantil**
- **F84.1 Autismo atípico**
 - F84.10 Atipicidad en la edad de comienzo
 - F84.11 Atipicidad sintomática
 - F84.12 Atipicidad tanto en edad de comienzo como sintomática
- F84.2 Síndrome de Rett
- F84.3 Otro trastorno desintegrativo de la infancia
- F84.4 Trastorno hiperkinético con retraso mental y movimientos estereotipados
- **F84.5 Síndrome de Asperger**
 - F84.8 Otros trastornos generalizados del desarrollo
 - F84.9 Trastorno generalizado del desarrollo sin especificación
- F88 Otros trastornos del desarrollo psicológico
- F89 Trastorno del desarrollo psicológico, no especificado

DSM

- *Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorders*(Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales), publicado por la *American Psychiatric Association*.



- El DSM-IV, publicado en 1994, definía el autismo y sus trastornos asociados como “trastornos generalizados del desarrollo” (TGD).
- En el DSM-5, esta definición ha sido sustituida por el término “trastornos del espectro autista” (TEA), que han sido incluidos a su vez dentro de una categoría más amplia de “trastornos del neurodesarrollo”.

CRITERIOS DE Dx.

Criteria diagnósticos del autismo revisados en el DSM-5 (traducción no oficial)

- A. Déficit persistentes en la comunicación y la interacción sociales en múltiples contextos, que se manifiestan actualmente o en el pasado de la siguiente forma:
 - 1. Déficit en la reciprocidad socio-emocional
 - 2. Déficit en los comportamientos de comunicación no verbal utilizados para las interacciones sociales
 - 3. Déficit en el desarrollo, en el establecimiento y la comprensión de las relaciones.

- B. Repertorio de comportamientos, intereses o actividades restringidos y repetitivos, manifestando por lo menos dos de los siguientes criterios actualmente o en el pasado:
 - 1. Movimientos motores, utilización de objetos o vocalización estereotipados o repetitivos
 - 2. Insistencia en la monotonía, apego inflexible a la rutina o patrones rituales de comportamientos verbales o no verbales
 - 3. Intereses muy restringidos y fijos con un grado anormal de intensidad y de focalización
 - 4. Reacción inusual a los estímulos sensoriales o interés inusual por los aspectos sensoriales del entorno.

- C. Los síntomas deben presentarse desde un periodo temprano del desarrollo (aunque pueden no manifestarse plenamente hasta que las capacidades limitadas ya no permiten responder a las exigencias sociales, o ser encubiertos más tarde por estrategias aprendidas).

- D. Los síntomas suponen deficiencias importantes desde el punto de vista clínico en el ámbito social, profesional o incluso en otros ámbitos de funcionamiento.

- E. La discapacidad intelectual (trastorno del desarrollo intelectual) o un retraso general del desarrollo no justifican mejor estos trastornos.



Cuadro Clínico

Falta de interacción social



Estereotipias




Poca tolerancia a la frustración



Risas o llantos sin motivo aparente



Hiperactividad o hipo actividad




Nulo juego simbolico



Carencia de juego creativo



Tratamiento



Conductual

- Applied Behavior Analysis ó ABA
- Comprehensive application of behavior analysis to schooling / Aplicación comprensiva del análisis del comportamiento a la enseñanza; CABAS



CABAS
is the acronym for
Comprehensive Application
of Behavior Analysis to
Schooling

by alliacronyms.com



Integración Sensorial




AUTiSM

And Diet?



Nutricional

- Sin Gluten
- Sin Caseína
- Sin Lácteos



Tx. Médico



Medicamentos de control



Metilfenidato

Comprimidos

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN:

Cada COMPRIMIDO contiene:

Clorhidrato de metilfenidato..... 10 y 20 mg

Excipiente, c.b.p. 1 comprimido.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Neuroestimulante.

Estimulante del sistema nervioso central, que está indicado como parte del tratamiento del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH).

Indicado para el tratamiento del trastorno del sueño conocido como narcolepsia.

CONTRAINDICACIONES: En pacientes que sean hipersensibles al METILFENIDATO o a cualquiera de los componentes de la fórmula.

Otras contraindicaciones incluyen: Casos de pacientes alcohólicos, con ansiedad, depresión mayor, hipertensión, psicosis, crisis convulsivas, abuso de sustancias, ideación suicida, hipertiroidismo, glaucoma, arritmias cardíacas y angina de pecho severa.

También está contraindicado en pacientes con tics motores o tics o con el diagnóstico o antecedentes familiares del síndrome de Tourette.

PRECAUCIONES GENERALES: No deberá ser utilizado en niños menores de 6 años, ya que no se han establecido su seguridad y eficacia en este grupo de edad.

No está indicado en todos los casos de TDAH, por lo que deberá ser recetado sólo después de una evaluación minuciosa y una historia clínica detallada.

La administración de METILFENIDATO deberá basarse en la valoración de la severidad de los síntomas y la edad del niño. No debe prescribirse sólo por la presencia de uno o más de los síntomas de este padecimiento.

Cuando los síntomas del niño se asocien con reacciones agudas de estrés, no está indicado el METILFENIDATO.

El METILFENIDATO tiene un alto potencial como sustancia de abuso. La administración de este medicamento por un periodo prolongado puede generar dependencia psicológica.

Cada cápsula contiene:

Clorhidrato de atomoxetina
equivalente a 10,18, 25, 40, 60, 80 o 100 mg
de atomoxetina

Excipiente, c.b.p. 1 cápsula.

Descripción: STRATTERA* (atomoxetina) **es un inhibidor potente del transportador presináptico de norepinefrina** con afinidad mínima por otros receptores noradrenérgicos o por otros transportadores de neurotransmisores o receptores.

STRATTERA* es un medicamento no estimulante. Se encuentra disponible en cápsulas para administración oral.

Cada cápsula contiene clorhidrato de atomoxetina equivalente a 10, 18, 25, 40, 60, 80 o 100 mg de atomoxetina.

Las cápsulas también contienen almidón pregelatinizado y dimeticona.

La cobertura de la cápsula contiene gelatina, lauril sulfato de sodio y otros ingredientes inactivos. También contiene uno de los siguientes: colorante azul No. 2, óxido de fierro amarillo, dióxido de titanio. Las cápsulas están impresas con tinta negra comestible.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Atomoxetina está indicada para el tratamiento del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en niños mayores de 6 años de edad, adolescentes y adultos.

Advertencia:

Los estudios han demostrado que los niños y adolescentes con trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH; que tienen más dificultad para enfocarse, controlar sus acciones y permanecer quietos o en silencio que otras personas de la misma edad) que toman atomoxetina tienen más probabilidad de pensar en suicidarse que los niños y adolescentes con TDAH que no toman atomoxetina.

Mientras su hijo esté tomando atomoxetina, debe controlar su comportamiento atentamente, especialmente al inicio del tratamiento y en cualquier momento que se incremente o reduzca la dosis. Es posible que su hijo desarrolle síntomas graves muy repentinamente, así que es importante prestar atención a su comportamiento todos los días. Pídale a otras personas que pasan mucho tiempo con su hijo, como hermanos, hermanas y maestros que le informen si observan cambios en el comportamiento de su hijo. Llame a su médico de inmediato si su hijo experimenta cualquiera de estos síntomas: actúa más reservado o retraído de lo normal; si se siente desvalido, desesperado o sin valor; tiene síntomas de depresión nuevos o que empeoran; piensa o habla de lastimarse o quitarse la vida o planea o intenta hacerlo; preocupación extrema; agitación; ataques de pánico; dificultad para conciliar el sueño o mantenerse dormido; irritabilidad; comportamiento agresivo o violento; actúa sin pensar; aumento extremo en la actividad o en hablar; excitación frenética, anormal; o cualquier otro cambio repentino o inusual en el comportamiento.

El médico de su hijo querrá ver a su hijo con frecuencia mientras esté tomando atomoxetina, especialmente el comienzo de su tratamiento. Es posible que el médico de su hijo también quiera hablar con usted o su hijo por teléfono ocasionalmente. Asegúrese de que su hijo asista a todas las citas de visitas al consultorio o conversaciones por teléfono con su médico.

Su médico o farmacéutico le dará la hoja de información del fabricante para el paciente (Guía del medicamento) cuando inicie su tratamiento con atomoxetina y cada vez que vuelva a surtir su receta médica. Lea la información atentamente y pregunte a su médico o farmacéutico si tiene alguna duda. También puede visitar el sitio web de la Administración de Medicamentos y Alimentos (Food and Drug Administration, FDA) (<http://www.fda.gov/Drugs>) o el sitio web del fabricante para obtener la Guía del medicamento.

Hable con su médico sobre los riesgos de administrar atomoxetina a su hijo, de usar otros tratamientos para la condición de su hijo y de no tratar la condición de su hijo.

- Antipsicótico. Risperidona RISPERDAL[®] está indicado en el **tratamiento de un amplio rango de pacientes con esquizofrenia**, incluyendo **primer episodio de psicosis**, exacerbación aguda de esquizofrenia, esquizofrenia crónica y otras condiciones de psicosis que cursen con signos positivos (alucinaciones, delirios, ilusiones, alteraciones del pensamiento, hostilidad) y/o síntomas negativos (como por ejemplo: aplanamiento afectivo, abandono emocional y social, disminución de la expresión, pobreza en el lenguaje). RISPERDAL[®] **alivia los síntomas afectivos (como depresión, sentimientos de culpa, etcétera)**, asociados con esquizofrenia. RISPERDAL[®] también **es efectivo en mantener la mejoría clínica durante la terapia continua en pacientes** que han tenido respuesta al tratamiento inicial. RISPERDAL[®] se indica para **el tratamiento de trastornos de la conducta en pacientes con demencia en quienes los síntomas como agresividad** (arranques verbales, violencia física), trastornos en la actividad (agitación, deambulación) o cuando los síntomas psicóticos son prominentes. RISPERDAL[®] **se indica en el tratamiento de episodios maniacos asociados al trastorno bipolar.**
- Efectos secundarios
Algunos de los efectos que causa son: **aumento de masa corporal, discinesia, acatisia, falta de energía, aumento de salivación**, disfunción sexual, eyaculación retrógrada, ansiedad, **insomnio**, baja presión arterial, **sedación, dificultades con el sueño, entumecimiento** nasal, obturación nasal, dolor de cabeza, náuseas, sangrado de nariz y **sobre todo falta de energía,**

Advertencia:

Según estudios realizados, los adultos de edad avanzada con demencia (un trastorno del cerebro que afecta la capacidad para recordar, pensar con claridad, comunicarse y realizar actividades cotidianas, y que puede ocasionar cambios de estado de ánimo y personalidad) que toman antipsicóticos (medicamentos para las enfermedades mentales) como risperidona tienen mayor riesgo de morir durante el tratamiento. Además, los adultos de edad avanzada con demencia tienen mayores probabilidades de sufrir un accidente cerebrovascular o un mini accidente cerebrovascular durante el tratamiento. Dígales a su médico y a su farmacéutico si está tomando furosemida (Lasix).

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) no ha autorizado el uso de la risperidona para el tratamiento de problemas de conducta en los adultos de edad avanzada con demencia. Hable con el médico que recetó este medicamento si usted o algún familiar o ser querido suyo tiene demencia y está tomando risperidona. Si desea más información, visite el sitio de Internet de la FDA: <http://www.fda.gov/Drugs>

Medicamentos Homeopáticos



Repertorizacion “Autismo”.

- Autismo – Trastorno del neurodesarrollo.
- Desarrollo, niños, mente_detenido.
- Desarrollo, niños, mente_lento.
- Autismo, interes, indiferencia, rodea.

AULLAR (♫ Gritos / Ladrá / Lamentarse) Acet-ac Acon
Alam am ars Aur bell brom bufo calad camph canth
caps Cham Cic cina colf cupr cupre-act ign ip lyc
merc moseph nat-m nux-v op Phos plat stann Stram
tarent verat Verat-v verb viol-t

- **noche**, por lar stram Verat
- **cólera**; con; am

AUSENCIAS [-> Inconsciencia - frecuentes]

AUSENTE; síndrome de la MADRE [-> Trastornos por -
desatendido - madre]

AUSENTE; síndrome del PADRE [-> Trastornos por -
desatendido - padre]

AUTISMO (♫ Desarrollo - detenido / Hablar - mismo; con-
sigo / Indiferencia - rodea); agar bar-c bufo cact kali-br
lyc secret Tub

- **niños**, en: agar bufo lyc tub

AUTOABUSO [-> Reprocha a]

AUTOAFIRMACIÓN; falta de [-> Dócil / Egoísmo; fal-
ta]

AUTOCOMPAISIÓN [-> Compadecer]

AUTOCONFIANZA [-> Seguro]

AUTOCONTROL (= dominio de sí mismo)

- **aumentado** (♫ Abnegación / Dominio / Emociones - do-
minadas); ars aur calc care foll kali-c lyc mosch nat-c
nat-m nat-s sep sil stram
- **niños**; en: kali-c nat-s sil
- **falta de** [-> pérdida]
- **pegarse un tiro**; para evitar [-> Lesionarse - tirarse]
- **pérdida del** (♫ Fuera de / Fuera de - general / Revisa - dos);
agar anac anh arg-met arg-n eurst cham olnd op
staph sulph tarent tub
- **como** si fuera a perder el autocontrol; geis lact

AUTODEPRECIACIÓN [-> Confianza - falta - auto-
depreciación]

AUTODESCONFIANZA [-> Confianza - falta]

AUTODESTRUCTIVO; aur

AUTODISCIPLINA [-> Autocontrol]

AUTOENGAÑO; act-sp

AUTOESTIMA

- **alta** [-> Egoísmo]
- **baja** [-> Confianza - falta]

AUTOFOBIA [-> Miedo - solo]

AUTOINCULPARSE [-> Reprocha a]

AUTOMÁTICOS; gestos [-> Gestos - automáticos]

AUTOMATISMOS [-> Gestos - automáticos / Incons-
ciencia - conducta]

AVARICIA (♫ Ansiedad - negocios / Avidéz / Celos); ARS
bar-c bry calc calc-f cina coloc Dule Lyc med meli
Merc nat-c phos plat psor Puls rheum Sep Sil sulph

- **alternando** con l **despilfarro** [-> Despilfarra - alternan-
do - avaricia]
- **ansiedad** sobre el futuro; avaricia por (♫ Ansiedad - futu-
ro); Bry Psor
- **caro**; todo le parece muy; lach sep sil
- **generosidad** hacia los extraños; avaricia con su familia

AVASALLADOR [-> Ativo]

AVENTURERO (♫ Temerario / Valiente / Viajar - desaci-
cate Med Tub

AVERGONZADO [-> Trastornos por - turbación]

AVERSIÓN (♫ Disgusto)

- **acerquen**; a que se le [-> Acerquen - aversión]
- **afecto por nadie** | **embarazo**; no tiene afecto durante el;
Sep
- **agua**; al: Am-c Lyss
- **alzado**; a ser; bry
- **amigos**; a los (♫ Compañía - aversión - amigos / Crítico -
amigos / Incompasivo - amigos); anac Aur-m cedr coloc
Con ferr fl-ac kali-m Led pitu-a
- **embarazo**; durante el: Con
- **bullicio**; al: nat-m
- **cama**; a la [-> Cama - aversión]
- **caras sonrientes**; a: m-aust
- **colores** [-> Colores - aversión]
- **educación**; a la: sulph
- **esposa**; a su: ars Fl-ac nat-s plat puls staph
- **esposo**; a su (♫ hombres; a los [=sexo masculino] - mu-
jeres / Disgusto - cuerpo - otros - marido / Miedo - hombres;
de los [=sujetos varones]); agn Glon kali-c kali-p Nat-c
nat-m pitu-a Sep thuj verat
- **extraños**; a los [-> Compañía - aversión - extraños]
- **familia**; a los miembros de su (♫ Incompasivo - familia /
Separado - familia); am-m aur borx Calc calc-s cit-ac
con Croc-h Fl-ac hep iod kali-c kali-m kali-p lyc
Merc Nat-c phos plat plb senec Sep
- **demás**; pero habla amablemente a los (♫ Comporta-
miento - niños - casa / Separado - familia - extraños); fl-ac
- **flores**; olor de las: graph
- **hombres**; a los [= en general] [-> personas - todas]
- **hombres**; a los [=sexo masculino] (♫ Miedo - hombres; de
los [=sujetos varones] / Odio - hombres; de los [=sujetos va-
rones] / Sensible - ruido; al - voces - masculinas); am-c calc
graph lyc med nat-m Puls raph sep staph sulph
- **mujeres**; en (♫ esposo / Delirio - miedo / Delirio - miedo
- hombres); am-c med nat-m puls raph sep staph
sulph
- **religiosa**; aversión (♫ Matrimonio - intolerable); lyc
Puls sulph
- **hombres**; a los [túbrica antigua]; graph stann
- **interferencia**; a la [-> Interrupción - aversión / Molestado
/ Trabas]
- **lugares**; a ciertos; hep
- **madre**; a la (♫ Odio - madre); thuj
- **matrimonio**; al (♫ Matrimonio / Matrimonio - intolerable);
puls
- **mujeres**; a las (♫ mujeres - hombres / Homosexualidad /
Odio - mujeres); am-c bapt con Dios fl-ac ign Lach
mag-c nat-m phos Puls raph sep staph sulph
- **hombres**; en (♫ mujeres / Homosexualidad / Ilusiones-
mujeres - malvadas); am-c nat-m phos puls sep staph
sulph
- **homosexualidad**; con (♫ Homosexualidad); phos
puls staph
- **religiosa**; aversión (♫ Matrimonio - intolerable / Odio
- mujeres); lyc Puls sulph

DEFECACION

antes de la - agr.: ...

in-aust **Mag-c** mang meny **Merc** merc-c mez nat-c
nat-in nat-s nit-ac nux-v op petr ph-ac phos plat
psor puls **Rheum** rhod rhus-t ruta sabad sars seneg
sep sil spig stann staph stram stront-c sulph thuj
valer **Verat** viol-t zinc

después de la

- agr.: acon **Aesc** aeth agar agn aloe **Alum** am-c
am-in ambr anac ang ant-t apoc arg-met arn ars
asar bar-c bell borx bov bry cale calc-p camph
canth caps carb-an carb-v **Caust** cham chin coc
coloc con cupr dig dros dule euph ferr fl-ac **Gamb**
graph hell hep hir hydr hyos **Ign** iod ip **Iris** kali-bi
kali-c kali-n lach laur lept lyc m-ambo m-aret
mag-c mag-m merc **Merc-c** mez mur-ac nat-c
nat-in nit-ac nux-m **Nux-v** olnd op petr ph-ac **Phos**
plat plb podo puls rat rheum rhod rhus-t ruta sabad
sabin sars sec **Sel** seneg sep sil spig spong stann
staph stront-c sul-ac sulph tarax tell teucr thuj valer
verat zinc

- mej.: acon agar aloe alum *Am-m* ant-c ant-t ars-i
asaf aur bar-c bism *Borx* bov brox-gau **Bry** calc-p
canth caps caust cham cina coff **Colch** coloc *Con*
croc cycl cyt-l dig dule ferr *Fl-ac* **Gamb** glon guaj
hell hep ip kali-bi kreos mag-c mand mang meny
Merc mur-ac nat-c *Nat-m* **Nat-s** *Nux-v* op ox-ac
oxyt pall par ph-ac plb psor *Puls* rauw rheum
Rhus-t sabad *Sang* seneg sep **Spig** squil *Sulph* thuj
verat

• **durante** la | agr.: acon agar agn alum am-c am-m
ambr anac ang ant-c ant-t apis arg-met arn **Ars** asaf
asar aur bar-c bell borx bov bry calad calc camph
cann-s canth caps carb-an carb-v caust **Cham** chel
chin cocc colch coloc con cupr cycl dig dios dros
dule euph ferr graph guaj hell hep hyos ign iod ip
Iris **Kali-bi** kali-c kali-n kreos lach laur lyc m-ambo
m-aust mag-c mag-m meny **Merc** merc-c mez
mosch mur-ac nat-c nat-m nit-ac nux-m nux-v olnd
op paeon par petr ph-ac phos plat plb **Puls** ran-b
rheum rhod rhus-t ruta sabin sars sel seneg sep sil
spig spong squil stann staph stram stront-c sul-ac
Sulph tarax thuj verat verb viol-t yohim zinc

• suave

- después de | mej.: abrot ant-c **Ars** **Bry** guaj
kali-bi **Lach** lob mag-p mosch nat-s stann **Zinc**

• **urgente** | agr.: agar bell carb-an ign nux-v puls rat
rhus-t sep tell

DEFENSA; MECANISMO DE | **pobre** [→ Falta /
desfilarse - tendencia / Trastornos - agudos - recurrentes]

DEFICIENTE físico [→ Inusválida]

DEGENERACIÓN de los tejidos; tendencia a la

(→ Grasa); am ars med vanad

• mayor; en gente | **ancianos**: bar-c

• **Sanguíneos**: de los vasos [→ Sanguíneos - degeneración]

DELGADA; gente (→ Alta / Emaciación); acet-ac alum

Ambr *Ars-met* Ars-n ars ars-i bapt bar-c beryl bry

DELGADA; gente: ...

• **mujeres**: ambr

• **niños**; en: calc-sil phos sulph

• **tuberculinico**: estado: v-a-b

DELICADA; constitución (→ *MENT - Sensible / MENT -*

Elegancia); ars calc cale-p caust cimic cocc colch con

croc cupr *Ign* kali-p *Lyc* nat-c nux-m phos pic-ac

psor sep *Sil* stront-c sulph tab teucr verat xun zinc

• **nerviosas**: en personas: cocc *Xan*

• **niños**; en [→ Niños - delicados]

DELIRIO [→ *MENT - Delirio*]

DENTICIÓN [→ *DIEN - Dentición*]

DENUDADOS | **Huesos**: ars asaf aur calc chin con

hep lach lyc merc mez nit-ac ph-ac puls ruta sabin

sep sil staph sulph

DERMATOMIOSITIS (→ *Conexión / Si aren*); sulph

DESARROLLO (→ *Enanismo / Niños / MENT - Desarro-*

llo - detenido)

• **detenido** (→ *Enanismo / Niños / MENT - Desarrollo*); Agar

aloe ant-c bac *Bar-c* borx bufo *Calc* **Calc-p** *Carc*

cupr des-ac hypoth kreos lyc nat-m nep ol-an **Phos**

rad-br *Sil* sulfa syph thym-gl thyr toxo-g tub vip

- **vacunaciones**: por: thuj

○ **Músculos**: lyc

• **lento**: bac bar-c bufo *Calc* cale-p caust cupr kreos

lac-d mag-m med nat-m pin-s sil sulph thyr toxo-g

○ **Huesos** (→ *Caminar - aprender - tarde - desarrollo*); agar

Calc calc-f *Calc-p* ferr ph-ac puls sil suce-ac

• **rápido**: demasiado; ferr iod ph-ac phos

DESAYUNO

• **antes** del | agr.: croc

• **después** del

- agr.: Agar *Am-m* ambr anac ars bell borx *Bry* *Calc*

calc-sil carb-an carb-v carb-n-s **Caust** **Cham** chin

Con cycl *Dig* euph ferr form *Graph* grat *Guaj* hell

ign iris *Kali-c* *Kali-n* laur lyc mag-c mang *Nat-c*

Nat-m *Nat-s* nit-ac nux-m **Nux-v** par petr ph-ac

Phos plb puls rhod rhus-t sars *Sep*-sil stront-c

Sulph *Thuj* valer verat **Zinc** zinc-p

- mej.: acon alum am-c *Am-m* *Ambr* anac ars *Bar-c*

Bov bry *Calc* *Cann-s* canth *Carb-an* carb-v caust

Chel chin cina *Croc* ferr graph hell *Hep* *Ign* *Iod*

kali-c *Lach* *Laur* *Lyc* mag-c mag-m merc *Mez*

myric nat-c nat-m nat-p nat-s nit-ac *Nux-v* *Petr*

phos *Plat* *Plb* puls *Ran-b* ran-s rhod *Rhus-t* *Sabad*

Sep *Spig* *Squil* *Staph* *Stront-c* *Sulph* *Tarax* teucr

valer verat *Verb* zinc-p

DESCENDER

• agr. (→ *Movimiento - descendente / MENT - Miedo - caer*):

acon alum am-m *Arg-met* bar-c bell herb **Borx** bry

canth coff *Con* **Ferr** gels *Lyc* meny nit-ac phys plb

Rhod rhus-t *Ruta* sabin sanic *Stann* stram sulph

Verat verb

• **descender** a la tierra baja; desde la: borx

- **fiebre**: durante la: ...
ferr-p iod lyc mur-ac Nit-s-d Op Ph-ac phos Puls Sep stram verat viol-t
- **gozo** de los demás; al (♂ *placer*): acon alum am-c ambr anac Anthraci apis aur bell cadm-met cann-s carb-v cham cina coloc Croe dros hell ip kali-p laur lyc meny nat-ar Nat-m nit-ac prun Puls sabin tab - y al sufrimiento (♂ *sufrimiento - demás*); ambr anac Anthraci carb-v cina hell Op puls
- **gozo**; sin (♂ *bromas / felicidad / placer*): alum apis aur bell camph cann-s card-m cham coff dros hell ip laur mag-m meny Nat-m nit-ac Op Puls sabin sars Sep spig
- **gripe** | **después** de: Cadm-m
- **hecho** por ella; por todo lo que han (♂ *Desagradecido*): Lil-t
- **hijos**; hacia los | **madre** hacia sus hijos; indiferencia de la (♂ *familia / Aversión - niños / Descuida - hijos (ella); a sus*): aur-ar kali-i Lye nat-c PHOS sacch-a SEP
- **importantes** (♂ *Descuida - importantes*)
- **cosas**; a las: calc fl-ac
- **interrogatorios**; a los: tanac
- **irritantes**, desagradables; a cosas: ambr anac borx cina coc-c coff op rhod
- **jovialidad**; después de: carb-n-s
- **lánguidos**; en jóvenes: aur
- **lee**; mientras: mez
- **llanto**; con (♂ *Llanto*): caust ign
- **manía**; en la: camph
- **masturbación**; después de (♂ *Trastornos por - sexuales; excesos*): Staph
- **menstruación**
- **antes** de la (♂ *Menstruación - antes*): nit-ac
- **durante** la: rhod sep
- **mental**; esfuerzo | **después** de: nat-m
- **mismo**; consigo: phos sep thuj-l
- **mlahumorado**: am-c bac bov lach Verat
- **modorra**; con f→ *somnolencia*
- **morir**; a: sapo
- **muerto** para él; todo parece (♂ *Ilusiones - muerto - todo*): Ph-ac
- **mujeres**; a las: nat-m
- **música**, que ama; a la: Carb-v caust ign
- **negocios**; a los asuntos de (♂ *dinero / intelectual / Negocios - aversión*): aesc agar Arg-n arn Calc con Fl-ac ham Kali-bi kali-p myric myris nat-ar Ph-ac phys phyt psil Ptel Puls rhus-t Sep Stram Sulph
- **niños**; en (♂ *amadas / familia*): phos
- **padres**; a los (♂ *amadas / familia*): all-c cina phos sep
- **periódica**: ars chin
- **personal**; a la apariencia f→ *apariciencia*
- **personas**; a todas las: cberth kali-m mez
- **placer**; al (♂ *agradables / gozo de / gozo; sin*): alum anac Arg-n Ars ars-i calc-ar cench Cham chinin-ar Chinin-s cocc croc ferr-p graph Hell hep hura ip kali-ar kali-c kali-m kali-p kali-sil mag-c mag-m meph mez mur-ac nat-ar nat-c Nat-m Nit-ac Op petr

INDIFERENCIA: ...

- **queja**; no se (♂ *Bien - dice - enfermo / Quejas / Quejas - nuncia*): colch Hyos Op Stram
- **a** menos que se le pregunte; no dice nada de su estado: colch
- **queridas**; a personas f→ *amadas*
- **queridos**; incluso hacia los amigos más (♂ *amadas*): nat-sil phos
- **recuperación**; por su: ars aur-m-n Calc
- **relaciones**; a las (♂ *familia / Olvidado - amigos*): acon bac bell Fl-ac Hell hep hyos kali-p merc nat-c nat-p PHOS plat SEP Syph verat
- **religión**; a su (♂ *Religiosas - falta*): anac coloc med sil - **importa** si irá al cielo o al infierno; no le: med
- **reprimenda**; a toda (♂ *Reir, reirse - reprimendas*): tub verat
- **rodea**; por lo que le (♂ *Autismo / Hipocondría - interesa / Implicación - reducida*): abel allox ars-i bac calc-s kali-p levo merc mez nat-sil phos phyt pic-ac raja-s rumx sel sul-i thuj-l
- **sexo** opuesto, al: puls Sep thuj
- **sociedad** f→ *compañía*
- **somnolencia**; con: acon am-m ammc ant-t ars carb-an carb-v chel cinnb croc dig dule grat ip laur lyc mag-c mag-m nat-c nep rat sapo sars tong verb Zinc
- **sufrimiento**; al (♂ *condición / Bien - dice - enfermo*): anac bac Hell Op Stram
- **demás**; de los (♂ *gozo de - y / Crueldad / Duro de*): anac
- **taciturna** (♂ *Taciturno*): allox bac calc plat staph
- **tiempo** | **tormentoso**: sang tub
- **tifoidea**; en la fiebre (♂ *fiebre*): ail Apis Arn chin Ph-ac Rhus-t
- **todo**; a (♂ *Atractivo / Descuida - todo*): acet-ac Acon agar ign ail ambr anac Apis arg-n arn Ars asaf Aur Aur-m bapt bell berb bism bov bry buth-a Cadm-met calc cann-s canth caps Carb-v cham chin cic Cimic Cina con croc cypr cyt-l dig fl-ac Gels glyc Hell hydr hydr-ac hyos ign indol kali-ar kali-chl kali-m lach lepi lil-t Lyc mag-c meny Merc merl mez nat-c Nat-m nat-p nit-ac Nit-s-d nux-m Nux-v Op Ph-ac Phos phyt Pic-ac pitu Plat psil Puls pycnop-sa Rheum rib-ac sec sel Sep stann Staph sulph syph thuj Thyr verat ziz
- **trabajo** (♂ *Pereza*): agar allox cadm-met ign kali-m lach pycnop-sa sacch-a squil staph
- **aversión** al trabajo; con (♂ *Pereza*): agar allox cadm-met ign lach pycnop-sa squil staph
- **transpiración**; durante la: apis Ars Bell Calc Chin Lach Ph-ac Phos Puls sel Sep
- **tristeza**; con: cic ph-ac
- **ventana** durante horas; mirar por la f→ *Mirando - ventana*
- **vida**; a la: absin Ars bov cham fago phos Phyt rhus-v sulph Tab
- **INDIGNACIÓN** (♂ *Cavila / Cólera / Injusticia*): acon ambr Ars aur brox-gau Calc-p caps chin cocc Colch Coloc croc ferr-p gels graph ign ip led m-ambo med

R=

- agar 2/4
- bar - c 2/4
- *Calc - C* 2/4
- **Calc - P** 3/4
- *Phosp* 2/4

- MERCURIUS SOLUBILIS
- LYSSINUM
- HELLEBORUS
- CHOCOLATE
- SILICEA
- STRAMONIUM

OTROS

- HYOSC, OP, TARENT,
- LYC, NUX-V, IGN,

