DR. ALEJANDRO ORTIZ CAMIRO

MÉDICO HOMEÓPATA, CIRUJANO Y PARTERO ESCUELA LIBRE DE HOMEOPATÍA DE MÉXICO, A.C.

ESPECIALIDAD EN TERAPÉUTICA HOMEOPÁTICA IETS "MATATIPAC, A.C."

PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MÉDICOS HOMEÓPATAS, CIRUJANOS Y PARTEROS DEL ESTADO DE VERACRUZ – LLAVE "DR. SAMUEL HAHNEMANN" A.C.

- CICATRIZ: Marca que queda después de la curación de una herida u otro proceso mórbido.
- Está constituida por tejido fibroso, diferente de los tejidos en los que se produce.
- La presencia de ciertas enfermedades, por ejemplo la diabetes, puede hacer mucho más lento el proceso.

- CICATRIZACIÓN: Es el restablecimiento de la integridad de un tejido lesionado, en la que participan los vasos sanguíneos, el tejido conjuntivo y los glóbulos blancos.
- * Sólo se puede conseguir una buena cicatrización si la irrigación del tejido es buena.

Cicatrización por primera intención.

Es aquella en la cual la unión o el restablecimiento de la continuidad ocurre directamente sin intervención de granulaciones.

Cicatrización por segunda intención.

Es la unión o cierre de una herida por granulaciones que se forman desde la base y los dos lados hasta la superficie de la herida.

 La mayoría de las cicatrices pequeñas desaparecen con el tiempo; las mayores, si lo requieren, pueden ser reducidas en sus dimensiones y hacerse así menos visibles mediante una

intervención de cirugía plástica.

Un tipo especial de cicatriz, denominada queloide, es la que se presenta como un cordón duro y con relieve, puede resultar difícil de eliminar.





 CICATRIZ QUELOIDE: Tumor benigno fibroso que puede producirse en la piel como resultado de una cicatrización.

Se forma como consecuencia de quemaduras, abrasiones, incisiones quirúrgicas o graves manifestaciones de acné, y se presenta como un notable cordón saliente, de color blanco o rosado y aspecto desagradable.

- Es más frecuente entre individuos de raza negra.
- Existen algunas técnicas médicas que pueden funcionar. la crioterapia o los tratamientos con láser, que llegan a reducir el tamaño de los queloides, dependiendo del cada caso en particular. También puede ser radioterápico o mejor, quirúrgico. De hecho la extirpación es aconsejable no sólo por razones estéticas o funcionales, sino también porque a veces sobre un queloide puede aparecer un tumor maligno (sarcoma).

- CUIDADOS ESPECIALES:
- <u>No tomar el sol</u> desmesuradamente durante los primeros meses de formación del queloide, de forma contraria, aumentamos el riesgo de que se quede coloreado permanentemente.
- No llevar ropas muy ajustadas que puedan rozar a la zona afectada.

HERIDAS QUIRÚRGICAS. Son punzocortantes. Realizadas en un acto quirúrgico en donde interesan varios tejidos del cuerpo (piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis de los músculos, peritoneo etc...). No olvidando que han sido segmentados los filetes nerviosos y vasos sanguíneos de la zona donde se llevó a efecto la incisión por el bisturí.

 Las cicatrices en el interior del cuerpo, causadas por lesiones o intervenciones quirúrgicas, raramente causan trastornos. A veces, se pueden producir adherencias, es decir, el tejido cicatrizal de una herida se une a los tejidos u órganos vecinos, pudiendo trastornar en algunos casos su normal funcionamiento y complicando si fuera necesaria una segunda intervención quirúrgica en la misma zona.

- TRATAMIENTO HOMEOPÁTICO:
- CICATRIZACIÓN.- Existen en la materia médica varios medicamentos que podemos emplear para evitar que el proceso de cicatrización sea interrumpido por una infección y en algunos casos, dados a tiempo se puede evitar la formación queloidea.

■ Calcárea carb.- Piel FRÍA, SUAVE, FLOJA; FACILMENTE MALSANA, en el sentido que las heridas más insignificantes supuran fácilmente, el enfermo se defiende mal y su vitalidad disminuida se traduce tanto por su debilidad física y mental como por su desmineralización.

- Caléndula off.- Acción externa e interna sobre todas las heridas traumáticas produciendo la cicatrización rápida e impidiendo la supuración.
- Causticum.- Piel blanquizca y sucia con erupciones tórpidas, CICATRICES DOLOROSAS. Malos efectos de <u>quemadas</u> <u>profundas.</u>

- Fluoric acidum.- Antiguas cicatrices que se vuelven pruriginosas, rojas en sus bordes y se cubren de pequeñas vesículas.
- Graphites.- RUGOSIDAD, DUREZA, SEQUEDAD PERSISTENTE en regiones de la piel enferma. Primer período de los queloideos; Hay que recordar el empleo de GRAPH. Para hacer REABSORBER EL TEJIDO CICATRIZAL.

El estado de mala nutrición de los tejidos, explica su influencia sobre los tejidos de reparación de la economía que se forman mal, determinando en cicatrices marcada induración. Viejas heridas con tendencia a indurarse y hacerse queloides, GRAPH. detendrá a menudo esta induración o la disminuirá.

■ Thiosinaminum.- (Enzima y Químico derivado del aceite de semillas de mostaza). Es un resolutivo externo e interno, para disolver tejido cicatrizal y adherencias. Inyectado debajo de la Piel, o en las lesiones al 10 por ciento en glicerina y agua, 15 a 30 gotas dos veces por semana.

■ HERIDAS QUIRURGICAS.- Deberemos tomar en cuenta el aspecto biológico y homeopático del tratamiento de las heridas, cuya base es el factor dietético. Es muy importante simplificarla mediante la supresión de la carne y el aumento de frutas y verduras, así como el consumo adecuado de líquidos.

- Los bordes de la herida se cuidarán protegiéndolos contra la compresión, tracción y contusión.
- El tratamiento homeopático local consiste en aplicar compresas con tinturas diluidas de Árnica mont., Caléndula off., Echinácea ó Symphitum off.
- La administración de los remedios homeopáticos por vía oral es indispensable:

- Árnica montana.- Esta indicada en todos los traumatismos o intervenciones quirúrgicas u obstétricas, chicas o grandes y en todos los casos que tengan en su etiología como determinante un traumatismo.
- Caléndula officinalis.- Heridas anfractuosas y desgarradas con tendencia a la supuración y dolor excesivo. En general a toda clase de heridas abiertas.

- Echinácea purp.- Está indicada en todas las afecciones cutáneas que se acompañan de un estado general grave.
- Hypericum perf.- Heridas por objetos puntiagudos: (clavos, agujas, alfileres, espinas, mordidas de rata, etc.); cuando las regiones afectadas son ricas en FILETES NERVIOSOS, los dolores son AGUDOS E INTOLERABLES. Heridas lacerantes con mucha postración por pérdida de sangre.

- Staphysagria delf.- HERIDAS POR INSTRUMENTOS PUNZO-CORTANTES CON INCISIÓN NETA, COMO DESPUÉS DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA. Prurito violento.
- Symphitum off.- Indicado en heridas penetrantes de periostio y huesos. Dolores pellizcantes y dolorido en el periostio.

Existen otros medicamentos que podemos utilizar de acuerdo a la LEY de SEMEJANTES:

Ars-alb.; Calc-carb.; Crot-h.; Hep-sulph-calc.; Pyr.; Sil-t. etc.

BIBLIOGRAFIA

ENFERMEDADES DE LA PIEL
SEMIOLOGIA MÉDICA Y TECNICA EXPLORATORIA
DICCIONARIO MEDICO FAMILIAR
HOMEOTERAPIA DR. KARL STAUFFER
MANUAL DE MATERIA MÉDICA HOMEOPATICA
MATERIA MÉDICA HOMEOPATICA COMPARADA
MATERIA MÉDICA HOMEOPATICA

DR. GORDON C SAUER
DR. J. SURÓS
DR. S.R.D.
DR. KARL STAUFFER
DR. JOAQUIN R. PEREZ
DR. WILLIAM BOERICKE
DR. LEON VANNIER

GRACIAS