

HERPES Y TRATAMIENTO MÉDICO HOMEOPÁTICO

Definición

Herpes simple o labial

Infección muy común, con tendencia a ser recurrente, consiste en varias vesículas juntas ubicada en los labios cara y a veces en los ojos (queratitis herpética) y piel de zonas eczematizadas (erupción variceliforme de Kaposi o eczema herpético). Cuando se generaliza también puede provocar encefalitis graves y en la boca una gingivo estomatitis aftosa herpética.

Cuando la infección por el VHS no produce la muerte de algunas neuronas, los genomas virales se conservan en la célula en un estado de represión o inhibición que se conoce como latencia. El proceso de activación del genoma viral que da lugar a la replicación viral, origina las lesiones recidivantes lo que se conoce como reactivación.

Herpes zoster

Consiste en la inflamación de uno o varios ganglios sensitivos, raquídeos o intracraneales que se acompañan con violentas neuralgias radicales a lo largo del nervio sensitivo aferente y aparición de vesículas características en la piel subyacente al trayecto del nervio.

Es frecuente que se relacione con otras enfermedades debilitantes, como leucemia, Ca, VIH, etc.

El periodo de incubación no se ha podido precisar, aunque se sospecha que es de 14 días.

Clasificación

Herpes simple

Herpes zoster

Cuadro clínico

Herpes simple

Herpes zoster

Los pródromos son vagos, como astenia, catarro rinofaríngeo o síntomas bronquiales, con frecuencia la primera manifestación son parestesias y los dolores a lo largo del tronco nervioso correspondiente al ganglio sensitivo invadido, a veces el herpes zoster es puramente neurálgico, sin brotar las vesículas. Los dolores a veces son intensísimos. A menudo no hay fiebre, pero cuando se presenta es de corta duración.

Erupción vesiculosa unilateral distribuido en un dermatoma y acompañada de intenso dolor local.

La erupción consiste en maculo pápulas eritematosas que rápidamente se convierten en vesículas, en grupos de pequeñas vesículas que se desecan alrededor de la primer semana, su distribución es hemilateral, a lo largo de la raíz raquídea, siendo especialmente temible, la localización oftálmica que puede producir la ulceración de la córnea y la otica que puede generar sordera.

Las vesículas al principio tienen líquido seroso, luego purulento y finalmente se secan, en casos aislados producen ulceración o hasta gangrena que dejan cicatrices permanentes.
bucofaciales

Fiebre, malestar, mialgias, incapacidad para comer, irritabilidad y adenopatías cervicales que dura de 3 a 14 días.
rectales y perianales

genitales

En enfermedades de transmisión sexual, el periodo de incubación varía de 1 a 26 días.
panadizo herpético

Aparición brusca de edema, eritema, induración, dolor local en los dedos infectados, con lesiones vesiculosas o pustulosas, fiebre, etc.
Infecciones SNC y periférico
Infecciones viscerales.

La diseminación visceral que produce, neumonitis, meningoencefalitis y hepatitis, aparece en un 5 ó 10 % de los pacientes con diseminación cutánea, incluso estas formas generalizadas de la infección, son mortales con poca frecuencia.

El zona generalizado, es una asociación del zoster típico, con erupción variceliforme generalizada, ocurre con más frecuencia en pacientes con linfomas o una enfermedad sistémica muy seria.

auricular produce otalgia intensa y paroxística, alteraciones vestibulares e incluso parálisis facial.

El síndrome de Ramsay Hunt aparece cuando se afecta la rama sensitiva del nervio facial y se caracteriza por lesiones en el conducto auditivo y la lengua.

El zoster oftálmico es una infección que afecta la rama oftálmica del trigémino.

La queratitis herpética se manifiesta con dolor brusco, visión borrosa, quemosis, conjuntivitis, y lesiones dendríticas de la cornea. La corioretinitis del RN o VIH es una manifestación de la infección generalizada. La retinitis necrosante aguda es una complicación rara pero grave

Diagnóstico

Es clínico, basándose en el aspecto y distribución de las lesiones.

Topografía de la erupción

Es muy importante para el diagnóstico las lesiones están limitadas a una mitad del cuerpo se detienen bruscamente en la línea media, aunque pueden aparecer vesículas aberrantes, los tipos más frecuentes son:

Intercostal
Cervical
Braquial
Oftálmico
Genito crural
Femoral
Auricular
Dolor

El dolor, es el síntoma que anuncia la infección, y puede comenzar 48 a 72 horas antes de que aparezcan las lesiones.

Los niños y adultos jóvenes, a veces no se quejan de dolor.

En personas ancianas, el dolor puede ser muy severo y dura a veces meses y años, es de carácter agudo y terebrante con exacerbaciones, puede hacer pensar en apendicitis, cólico nefrítico o pleuresía la aparición de la erupción o la adenopatía aclaran el diagnóstico, cuando no existe el dolor en los primeros días de la aparición del zoster, hay motivos para confiar que no se presentara en el futuro.

Los dolores con frecuencia son muy vivos, urentes o quemantes

Con frecuencia la neuralgia persiste mucho tiempo después de curado el herpes.

Con frecuencia deja secuelas neurálgicas pos herpéticas violentas, que se prolongan durante meses y aun años.

El efecto más debilitante del herpes zoster, es la neuritis aguda y la neuralgia pos herpética

Factor pre disponente

En lesiones malignas, las drogas antitumorales o de otra índole, pueden ser las responsables del aumento en la incidencia del herpes zoster.

La infección herpética surge cuando en el organismo, disminuyen las defensas y se desarrolla la enfermedad, por ejemplo insolación, fatiga, resfriado, menstruación, aflicción, etc.

En pacientes inmunodeprimidos sobre todo en pacientes con enfermedad de Hoodkin o con linfomas no Hodkin el cuadro clínico es mas grave y hay mayor riesgo de generalización de lesiones cutáneas o incluso de afectación visceral múltiple. La diseminación cutánea se produce en 40 % de esos pacientes.

Tratamiento homeopático

Como podemos observar en la siguiente lista de medicinas, existen variantes interesantes, porque tienen íntima relación con la clínica, como son los sitios anatómicos en donde se presenta el herpes, por ejemplo cara, boca, genitales, ano, staphisagria describe un tipo clásico de herpes zoster, cerca del ojo como Lycopodium, en los oídos, piernas, etc., en fin se sugiere que revisen los medicamentos para descubrir todas esas variantes. De igual

manera el tipo de dolor y los síntomas concomitantes, son importantes para elegir el medicamento homeopático.

HERPES

Ano natrummur677

Antebrazo derecho nux830

Antebrazo izquierdo mercurius828

Antebrazo izquierdo picor violento manganum348

Antebrazo y muñeca mercurius829

Ardor y latido doloroso anacardium533

Bigotes nitricac312

Boca anacardium177

Boca ángulo carbveg262

Boca arsenicum298

Boca borax131

Boca comisura izquierda phosporus467

Boca costras natrummur349

Boca erupción escamosa ammcarb176

Boca nariz rhus177

Boca natrumcarb232

Boca sepia367

Brazos ambos redondos amarillentos helleborus182

Brazos zonas redondas natrummur978

Caderas sepia1116

Cara ammur74

Cara y ángulos de la boca lyc360

Cara y frente picor con erosión caps34

Cigoma izquierdo mercurius151

Codo pliegue cuprum273

Costillas inferiores, erupción de herpes, consistiendo en granos, rojos, pequeños, gruesos, con picor ardoroso y piquetes, como piquetes de ortigas, después de frotar la parte, está dolorosa, y al mismo tiempo escalofrío corre sobre esta parte, y en la parte superior del abdomen staph449

Cuello sulphur320

Cuello y nuca húmedo con mucho picor causticum1000

Dedo causticum1130

Dedos entre alumina994

Dolor ardoroso de desgarramiento mpart350

Dolor ardoroso todo el día mpart349

Erupción escamosa sulphur1681

Exuda fluido purulento natrumcarb921

Frente más quemadura que picor baryta108

Genital escroto y cerca del muslo, húmedo natrummur729

Genital prepucio sarsaparrilla331

Genitales labio mayor dulcamara217

Genitales, venereos ardor intolerable moschus116

Grupos de granos múltiple alumina1050

Labio inferior causticum352
Labio superior phosphorus468
Labio superior sarsaparrilla142
Mano entre pulgar y dedo anterior veratrum475
Mano izquierda natrumcarb801
Manos dulcamara298
Manos sarsaparrilla440
Manos staph509
Mejilla cerca del labio superior anacardium174
Mejilla derecha bryonia125
Menstruación antes carbveg666
Mentón como erupción nux185
Miembros piel agrietada graphites997
Muñeca magnes228
Muñeca manos ampollas con picor natrummur1008
Muslo graphites857
Muslo kali1356
Muslo kali1459
Muslo nitricac1083
Muslo parte posterior mercurius900
Muslos y piernas staph547
Nalga de un niño borax389
Nalgas causticum1138
Nariz ala nasal nitricac268
Nariz cerca del ojo lyc359
Nariz spigelia214
Nuca hyoscyamus379
Oído derecho lobulo mercurius195
Oído detrás ammur55
Oído lóbulo causticum276
Oídos detrás magnesiatur132
Oídos graphites194
Pecho y pantorrillas magnesiatur775
Picor como mordedura de pulga lyc1379
Picor donde hubo herpes calcarb238
Picor especialmente en el anochecer alumina1051
Picor excesivo ledum277
Picor solo de noche staph609
Picor y piquetes alumina1053
Pierna se desvanece graphites
Piernas calcarb1353
Pulgar e índice con picor ambra349
Quemantes al tocarse mercurius980
Rascado hasta el sangrado sulphur1680
Reaparece calcarb1470
Reaparece en axila codo y tarso calcarb1471
Reaparece nuevamente y pica calcarb1472

Reaparecen ambra407
Rodillas y debajo de la rótula phosphorus1487
Rojo con picor y ardor ammcarb661
Se extiende agar611
Se inflama graphites996
Tarso natrummur1080
Tibia pica violentamente lyc1392
Todo el cuerpo dulcamara356
Todo el cuerpo picor ardoroso mercurius982
Todo el cuerpo sarsaparrilla499
Vesículas con picor herpes incipiente nitricac1042
Zonas blancas en mejillas ammcarb162
Zonas sobre todo el cuerpo, pareciéndose al escorbuto y entre ellas, erupción como sarna,
herpes y ampollas
varios mercuriales91

Dr. Eduardo Espinosa Blancas.

Andalucía 146 Col San Rafael Azcapotzalco México D.F Teléfono 53528362